

Brugsanvisning til mindre anvendelse af DiPel DF (526-13)

- i solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland
- i jordbær, salat, spinat, kålroer, majroer, glaskål, jordskok, havefrøafgrøder og krydderurter samt korsblomstrede afgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland
- i jordbær, salat, spinat og krydderurter i væksthus

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for DiPel DF (526-13) til mindre anvendelse

Insektmiddel:

- Må kun anvendes i ovennævnte afgrøder til behandling mod sommerfuglelarver.
- Max 3 behandlinger pr. sæson/kultur.

Advarsel:

”Se DiPel DF etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for DiPel DF til mindre anvendelse

Kultur	Skadegører	Dosering	Tidspunkt
Solbær, ribs, stikkelsbær, brombær, hindbær, aronia, hyben og blåbær på friland	Larver af sommerfugle, bl. a. frostmålere og viklere	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Jordbær på friland og i væksthuse	Larver af sommerfugle, bl. a. jordbærvikler	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Salat og spinat på friland og i væksthuse	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl, hvidsværmere og ugle	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Kålroer, majroe, glaskål og jordskog på friland	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Bederoer på friland	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Havefrøafgrøder på friland	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Krydderurter på friland og i væksthuse	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99
Korsblomstrede afgrøder (vår- og vinterraps, sennep, rybs og olieræddike) til fremavl af frø på friland	Larver af sommerfugle, bl. a. kålmøl	1 kg/ha (1-3 beh.)	Ved begyndende angreb, BBCH 09-99

Vandmængde: Der anvendes fra 400 og op til 2.000 l vand pr. ha. Sprøjteknik og vandmængde vælges for hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante plantedele. Typisk anvendes 400-800 l vand på friland og 500-2.000 l i væksthuse.

Risiko for skade: Der er ikke rapporteret skade af produktet i de nævnte kulturer, men da dokumentationen ikke nødvendigvis er fyldestgørende, kan det ikke garanteres, at der ikke kan opstå skade.