



FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare(EUH401)

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloak afløb.

Ved indendørs bejdning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse.

Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

De bejdsede kartofler er bejdsset med Fungazil TM 100 som indeholder imazalil.

De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Information om førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFT-INFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).

Fungazil TM 100 - Svampemiddel

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 631-4.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Imazalil 100 g/liter (9,4% w/w).

Midlet er en opløsning til bejdning.

Indhold: 10 liter netto Fabrikationsnr.:

Fabrikationsdato:

Holdbarhed: 3 år efter fabrikationsdato

Registreringsindehaver:

Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 Maarssen
Holland.

Distribueres af:

Cillus A/S
Tåstrup Hovedgade 121
2630 Tåstrup
Telefon: 4491 6055

Etikette nr: II
GODKENDT
25. november 2015
for pakninger på
Miljøstyrelsen 10L

Mål: 395 x 150 mm

BRUGSANVISNING

Fungazil TM - 100 anvendes til læggekartofler for bekæmpelse af **Sølvskurv** (Helminthosporium solani), **Kraterråd** (Phoma spp) samt **Fusariumråd** (Fusarium spp).
Behandling af kartoflerne sker ved indlagring.

ANVENDELSE:

Fungazil 100 skal udsprøjtes med et til behandling af læggekartofler specielt designet udstyr, således at små dråber og ensartet påføring kan opnås.
Ved behandlingen skal kartoflerne være let fugtige, men aldrig våde, og kartoflerne skal rulle på transportbåndet, således at alle sider behandles med Fungazil 100. Bejdseudstyret skal være kalibreret, og rengøres ved pauser og efter brug med vand tilsat sprit. Mest mulig jord skal fjernes fra kartoflerne inden behandling. Gode lagerforhold skal tilstræbes. Bør ikke anvendes ved temperaturer under -5°C.

DOSERING:

Fungazil 100 anvendes alene med 150 ml (15 g a.i. imazalil) pr. ton kartofler. Der kan evt. tilsættes op til 2 ltr. vand, hvis der anvendes hydrauliske dyser,
Doseringen skal overholdes.

BEMÆRK:

Når påføring finder sted, skal transportbåndet være afskærmet, så sprøjtetågen ikke kommer ud i lokalet.

RESISTENS:

Imazalil tilhører gruppen af DMI fungicider (FRAC gruppe 3, Sterol Biosyntese Inhibitorer, SBI). Imazalil har i følge FRAC medium risiko for opbyggelse af fungicidresistens, men efter mere end 10 års anvendelse er der ikke konstateret resistens overfor imazalil hos kartoffel lagersygdomme. Der er krydsresistens til andre fungicider inden for gruppen af DMI-fungicider, men ikke til andre typer af midler. Med én behandling pr sæson anses risiko for resistensudvikling i praksis for at være lille.

Personlig beskyttelse:

Der anvendes beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse, beskyttelsestøj, handsker og støvler ved håndtering af midlet. Lokaludsugning anbefales.

Ved brand slukkes med pulver, skum eller vandtåge.

Bortskaffelse:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæskan. Emballagen må ikke genbruges

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.