



Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering af prydblplanter i væksthuse.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

 pirouette®

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af prydblplanter i væksthuse

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel nr. 544-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2008

ANALYSE

Pacloubtrazol 4 g/l (0,39% w/w)
Vægtfylde: 1,02

Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Indhold: 5 Liter

Midlet er et suspensionkoncentrat

Produktionsnr.: Se emballagen
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato,
Se emballage

Opbevares frostfrit

Etikette nr. IV
GODKENDT

19. januar 2016

for pakninger på
Miljøstyrelsen IV

Førstehjælp:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes

Ved brand

Sluk med vandtåge, pulver eller CO₂. Undgå enhver forurening af afløb og jord.

Registreringsindehaver:

fine

FINE AGROCHEMICALS LTD
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ UK
www.fine.eu

Distributør:


CILLUS

Cillus A/S
Taastrup Hovedgade 121
DK-2630 Taastrup
Telefon 4491 6055

© Pirouette er registreret varemærke af
Fine Agrochemicals Limited

PIR/DK/5L/16



Productname	Pirouette	 de kostendrukkers	
Country	Denmark		
Package size	5 L		
Label code	PIR/DK/5L/16 - label	Name	Fred v/d Spek
Label dimensions	150x130 (hxxw)	Draft	Version 2
Label date	Dec 2015		



Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til vækstregulering af prydblplanter i væksthuse.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

pirouette®

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af prydblplanter i væksthuse

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel nr. 544-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2008

ANALYSE

Paclbutrazol 4 g/l (0,39% w/w)
Vægtfylde: 1,02

Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Indhold: 5 Liter

Midlet er et suspensionkoncentrat

Produktions nr.: Se emballagen
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato,
Se emballage

Opbevares frostfrit

Førstehjælp:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes

Ved brand:

Sluk med vandtåge, pulver eller CO₂. Undgå enhver forurening af afløb og jord.

Registreringsindehaver:

fine

FINE AGROCHEMICALS LTD
Hill End House Whittington
Worcester WR5 2RQ UK
www.fine.eu


Distributør:

CILLUS

Cillus A/S
Taastrup Hovedgade 121
DK-2630 Taastrup
Telefon 4491 6055

© Pirouette er registreret varemærke af Fine Agrochemicals Limited

PIR/DK/5L/16

Productname	Pirouette		
Country	Denmark		
Package size	5 L		
Label code	PIR/DK/5L/16 - leaflet		
Label dimensions	150x130 (hwx)	Name	Fred v/d Spek
Label date	Dec 2015	Draft	Version 2

PIROUETTE®

BRUGSANVISNING

Pirouette er et systemisk middel til vækstregulering af prydblplanter i væksthuse. Det optages i planten gennem blade, stængel og rødder.

Planterne får herved et mere kompakt udseende, mere mørkegrønne blade og øget knopsætning.

Sprøjte- eller udvandingstidspunktet fremgår af doseringsskemaet.

Når planterne behandles skal de være i god vækst.

Væskemængde

Der udsprøjtes ca. 200 ml væske pr. m² ved fuldt plantedække (~ til begyndende afdrypning). Planterne må ikke være våde, når der sprøjtes. Ved udvanding bruges 50 ml væske pr. 10 cm potte. Der skal gå 24 timer fra behandling med Pirouette til der topvandes.

Opblanding af væsken

Efter bestemmelse af den nødvendige dosering af Pirouette, tilføres den beregnede mængde til ca. halvdelen af vandmængden under moderat omrøring, hvorefter resten af vandet tilsættes. Efterlad ikke sprøjtevæsken i tanken i længere perioder (f.eks. under middagspause eller over natten). Rens sprøjtetanken 3 gange med rent vand og udsprøjt væsken over det behandlede område.

Ved opblanding af Pirouette i vand og ved udsprøjtning skal der udvises stor omhyggelighed, så væsken ikke forurener borde, beton og jord under bordene, da efterfølgende kulturer kan være meget følsomme overfor selv lave koncentrationer af Pirouette. Beholder/tank rengøres grundigt efter brug.

Tankblanding

Pirouette må ikke tankblandes med andre produkter.

Behandling med biologiske produkter

Det er ikke belyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse. Biologiske prædatorer vil de fleste tilfælde kunne anvendes, men spørg altid leverandøren af nyttedyrene for udsætning, så forenelighed sikres.

Vær opmærksom på:

Snitblomster bør ikke behandles, hvis der skæres flere gange. Det anbefales at prøvesprøjte nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kulturforholdene ændres, inden hele partiet behandles. Jord og andre vækstmedier må ikke genanvendes til efterfølgende kulturer. Efter sprøjtning med Pirouette skal bladene være tørre, inden planterne håndteres. De første 3 dage efter behandling bør der anvendes egnede handsker ved håndtering af planterne.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501)

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse ud over det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetaingelser.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetaingelserne.

Dosering og behandlingstidspunkt.

Generelt

Kultur	Behandling			Dosering		Bemærkninger
	Udbringsmetode	Tidspunkt for behandling	Max antal behandlinger (interval) a) per behandling b) per kultur	Koncentration ml/l a) max pr behandling b) max per kultur	Vandmængde (l/ha) min - max	
Prydplanter dyrket i væksthush	Sprøjtning	Afhænger af kulturen	a) 5 (4-14 dage) b) 5	a) 25 ml b) 60 ml	1000-2000	Maksimal mængde pr. behandling: 40 l/ha Maksimal mængde pr. kultur: 120 l/ha
	Udvanding	Rodede planter	a) 1 b) 1	a) 10 ml b) 10 ml	Afhænger af pottestørrelse	Væskemængde pr potte: 10 cm potte: 50 ml 15 cm potte: 100 ml 20 cm potte: 200 ml

For en række arter specifikke arter gælder efterfølgende specifikke vejledninger. Ved anvendelse i andre arter, skal der prøvesprøjtes på et mindre areal for at bestemme korrekt dosering, tidspunkt og interval inden der behandles på et større areal. De anvendte doseringer og antal behandlinger skal dog være inden for den generelle godkendelse af Pirouette.

Artsspecifikke vejledninger:

Kultur	Dosering ml/l	Antal behandlinger	Min. interval mellem behandlinger	Udviklingstrin ved 1. behandling
<i>Ved udsprøjtning</i>				
Azalea	25 eller 12,5	1 2	- 8 dage	3-7 cm lange skud
Potteroser	10-20	1-3	7 dage	1-4 cm lange skud
Pelargonium	2-4	2	4 dage	2-3 uger efter potning eller når nyvækst er 4-5 cm.
Julestjerner	2,5-5	2	14 dage	5 cm lange skud
Kalanchoe	2-4	1-3	8 dage	2-3 uger efter potning
Krysantemum	25 eller 12,5	1 2	- 14 dage	5 cm lange skud
Udplantningsplanter - Lobelia - Petunia - Salvie - Verbena - Viola	0,625-1,25 2,5-5 5-10 5-10 2,5-5	4 5 2 1 3	4 dage 4 dage 4 dage - 4 dage	2-3 uger efter potning
<i>Ved udvanding</i>				
Liljer	1,15-10	1	-	3-5 cm høje planter
Krysantemum	0,25-2	1	-	Efter rodning
Exacum	4	1	-	2-8 cm høje planter
Petunia	0,25-0,5	1	-	Efter rodning
Salvie	0,25-0,5	1	-	Efter rodning